

FICHA TÉCNICA DEL LANGOSTINO COLORADO



Ha sido descrito desde Isla Lobos de Afuera (Perú) hasta la VIII Región de Chile. Su pesca comercial se realiza entre Coquimbo (30° S) y Talcahuano (37° S). Habita en fondos de grava, fango y a veces cubren márgenes de zonas rocosas entre 50 y 300 metros de profundidad.

La longitud cefalotorácica alcanza a los 40 mm, y presenta hasta 70 g de peso. Este recurso presenta una madurez sexual en un rango de tamaños que fluctúa entre los 19 y 27 mm de longitud de caparazón y la edad de primera madurez sexual corresponde a los 2,4 años. Es una especie heterosexual que presenta un marcado dimorfismo sexual.

Nombre común	Langostino colorado
Nombre científico	Pleuroncodes monodon
Talla promedio	40 milímetros

Presenta un ciclo reproductivo que se extiende durante casi todo el año; no obstante, se encuentran hembras ovígeras desde febrero hasta diciembre. El período de mayor concentración de hembras portadoras de huevos es entre mayo y octubre.

La pesquería del langostino colorado tiene sus inicios a fines de los 60, especialmente en la zona sur, y solo a partir de 1998 comenzó su extracción en la región centro-norte del país (principalmente en Coquimbo), aunque en 1994 ya habían detectado la presencia de esta cerca de Caldera en la III Región.